

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN NAVARRA

Informe Epidemiológico Semanal 17/2024 (22 al 28 de abril)

1. INFECCIONES POR VIRUS RESPIRATORIOS

Gripe: no se detecta circulación.

Covid-19: circulación esporádica.

Virus respiratorio sincitial: detección esporádica de casos en adultos.

Tabla 1. Tasas de consultas en atención primaria y casos confirmados de infección por virus respiratorios

	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Sem 13	Sem 14	Sem 15	Sem 16	Sem 17
Consultas en Primaria Tasa por 100.000 hab.																	
Infección respir. aguda	1234	1316	998	793	753	683	664	625	594	575	592	537	407	433	455	403	446
Síndrome gripal	233	260	169	105	67	53	32	25	19	20	19	15	10	6	6	5	8
Covid-19	83	73	35	21	17	7	6	3	2	2	2	2	1	2	3	3	4
Covid-19 (PCR+)	106	109	43	37	24	24	18	6	7	11	3	4	2	5	2	6	8
Ingresos hospitalarios	66	59	20	13	13	11	5	2	3	6	2	2	2	3	2	5	5
Gripe, casos confirmados	243	216	138	78	49	27	25	10	9	8	8	4	5	4	3	1	0
Ingresos hospitalarios	141	124	69	44	27	17	11	7	8	3	6	1	3	2	0	0	0
VRS, casos confirmados	24	33	14	19	10	8	6	1	3	6	1	1	3	2	3	0	3
Ingresos hospitalarios	14	18	7	9	5	7	3	0	3	5	1	1	3	1	2	0	2
Ingresos en <15 años	6	4	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

*Los datos de las últimas semanas pueden sufrir cambios cuando se complete la notificación.

La tasa de infecciones respiratorias agudas en atención primaria se situó en 446 casos por 100.000 habitantes, de los cuales, 8 por 100.000 correspondieron a síndrome gripal y 4 por 100.000 a covid-19.

Se han confirmado 8 casos de covid-19 y 5 fueron hospitalizados.

No se han confirmado casos de gripe.

Se han confirmado tres casos de virus respiratorio sincitial en adultos, dos de los cuales ingresaron.

Desciende la incidencia de neumonías, aunque siguen confirmándose casos de neumococo (333 desde enero) y *Mycoplasma pneumoniae* (297 desde enero). También se detectan casos de tosferina (67 desde enero).

Comentarios

Sigue habiendo detecciones esporádicas de virus respiratorios.


La vacuna antigripal de esta temporada ha mostrado una efectividad moderada y se estima que ha evitado más de 260 ingresos hospitalarios en Navarra. La vacuna del covid también muestra una efectividad media-alta para prevenir ingresos hospitalarios, estimándose que ha evitado más de 100 ingresos en esta temporada.

Recomendaciones preventivas generales

Para evitar los casos graves de infecciones respiratorias, en personas vulnerables (lactantes, personas de edad avanzada o con enfermedad crónica), y las de su entorno, conviene combinar las siguientes **medidas preventivas**:

- 1) Vacunación del covid-19 y de la gripe siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.** Reduce mucho la probabilidad de enfermedad grave, especialmente en las personas con más riesgo.
- 2) Distancia física interpersonal.** El mantener una distancia interpersonal de más de metro y medio minimiza el riesgo de transmisión. Cuando no puedan mantenerse estas condiciones conviene utilizar mascarilla.
- 3) Uso de mascarilla.** Reduce el riesgo de infectarse en la persona que la usa y de contagiar a otros.
- 4) Ventilación adecuada.** Optar por actividades al aire libre o con ventilación natural permanente y cruzada.

Ingresos hospitalarios semanales por covid, gripe y VRS



Los datos de la última semana pueden estar incompletos.


2. GASTROENTERITIS AGUDA

Se observan niveles altos de consultas por gastroenteritis aguda en atención primaria. En la semana 17 se notificaron 463 casos frente a menos de 400 en las semanas anteriores. Los casos se distribuyen en todas las edades y zonas geográficas. Entre los 139 casos con diagnóstico etiológico de la última semana, destacan el Norovirus (35 casos), Sapovirus (22 casos), Campylobacter (20 casos) y Rotavirus (18 casos).

Algunas medidas de control:

- Las personas con síntomas deberán abstenerse de manipular o preparar alimentos para otras personas.
- Extremar las medidas de higiene, especialmente el lavado de manos antes de comer y cada vez que se acuda al aseo, o se cambien pañales.
- Los niños pequeños con síntomas no deben asistir a la guardería.
- Notificar a salud pública ante la sospecha de un brote.
- Cocinar suficientemente las carnes de aves.

Gastroenteritis agudas (CIAP: D70 y D73) diagnosticadas en atención primaria



3. MORTALIDAD GENERAL EN NAVARRA

En la semana del 15 al 21 de abril se registraron 110 defunciones (última semana con datos completos). La tasa de mortalidad se mantiene en valores promedio.

Tasa de mortalidad semanal por todas las causas ajustada por edad y sexo. Navarra, 2022-2024

