



Posología

- No modifique la dosis ni deje de tomar el litio sin hablar antes con su médico/a.
- Si se le olvida tomar una dosis, tómela si no han pasado más de 3 horas.
- Si han pasado más de 3 horas, espere hasta la siguiente toma y tome la dosis habitual.
- No doble la dosis de litio para recuperar la olvidada.



Incompatibilidades

Debe informar a su médico/a si está en tratamiento con alguno de estos medicamentos: antiinflamatorios (puede tomar paracetamol), diuréticos, antihipertensivos, antiácidos, antibióticos, laxantes y digoxina.



Uso correcto

Los comprimidos de litio deben ser tragados enteros. No los chupe ni mastique. Tómelos preferentemente con las comidas.



Qué debo saber si estoy en tratamiento con Plenur® (carbonato de litio)

El litio es un estabilizador del ánimo utilizado en trastornos afectivos y en el tratamiento del trastorno bipolar



NO SE DEBE TOMAR
ESTE MEDICAMENTO...



SI ESTÁ EMBARAZADA
O EN PERÍODO DE
LACTANCIA



SI SUFRE UNA
INSUFICIENCIA RENAL
GRAVE



SI SUFRE UNA ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR GRAVE



EN CASO DE
DESHIDRATACIÓN



DURANTE EL TRATAMIENTO

- » Tome suficiente agua (entre 2-3 litros al día).
- » No modifique la cantidad habitual de sal.
- » Evite la cafeína (café, té, refrescos de cola).
- » Si tiene diarreas, vómitos o sudoración excesiva consulte con su médico/a.
- » No se preocupe si en los primeros días de tratamiento sufre náuseas, heces blandas o cansancio ya que suelen desaparecer en pocos días.

- » Debe ponerse en contacto con su médico/a si alguno de los siguientes síntomas es grave o no desaparece: agitación, temblor, pérdida de apetito, dolor de estómago, boca seca, excesiva salivación, labios inflamados, estreñimiento, diarrea, fiebre, sed excesiva, empeoramiento del acné, pérdida del cabello.
- » No debe conducir ni manejar maquinaria peligrosa hasta comprobar cómo le afecta este medicamento.

Mientras dure el tratamiento, su médico/a le realizará determinaciones de los niveles de litio en sangre para comprobar que son los adecuados (está en rango terapéutico), para lo cual:

- No debe haber modificado la dosis de litio en los 5 días previos a la analítica.
- El día de la extracción deberá ir sin tomar el comprimido de litio de la mañana. Una vez le hayan sacado sangre, la podrá tomar.
- No es necesario ir en ayunas salvo que así se lo hayan indicado.





Posología

- Ez aldatu dosia, eta ez utzi litioa hartzeari aurretik medikuarekin hitz egin gabe.
- Dosi bat hartza ahazten bazaiztu, hartzu 3 ordu baino gehiago igaro ez badira.
- 3 ordu baino gehiago igaro badira, itxaron hurrengo hartualdira arte, eta ohiko dosia hartzu.
- Ez bikoitzu litiozko dosia ahaztutako dosia berreskuratzeko.



Jakingarriak Plenur® (litio karbonatoa) hartzen dutenentzat

Litioa gogo-aldeartearen egonkortzaile bat da, nahasmendu afektiboen eta nahasmendu bipolarraren tratamenduan erabiltzen dena



**Servicio Navarro de Salud
Osasunbidea**



Bateraezintasunak

Medikuari jakinarazi behar diozu medikamentu hauetakoren bat hartzan ari bazara: antiinflamatorioak (paracetamola har dezakezu), diuretikoak, antihipertensiboak, antiazidoak, antibiotikoak, libragarriak eta digoxina.

Erabilera zuzena

Litiozko pilulak osorik irentsi behar dira. Ez miazkatu, eta ez murtxitatu. Har itzazu otorduetan, ahal dela.



**EZ HARTU MEDIKAMENTU HAU,
BALDIN ETA:**



HAURDUN BAZAUDE
EDO BULARRA EMATEN
BADIOZU HAURRARI



GILTZURRUN-
GUTXIEGITASUN LARRIA
BADUZU



GAIOTASUN
KARDIOBASKULAR LARRIA
BADUZU



DESHIDRATATUTA
BAZAUDE



TRATAMENDUAN ZEHAR, GOMENDIO HAUEK BETE:

- » Ur nahikoa hartzu (2-3 litro egunean).
- » Ez aldatu ohiko gatz-kantitatea.
- » Ez hartzu kafeina/kafea, tea eta kola-freskagarriak.
- » Beherakoa, gorakoa edo izerdi gehiegizko baduzu, galduet medikuari.
- » Ez kezkatu tratamenduaren lehen egunetan goragaleak, gorotz bigunak edo nekea izaten baditzuzu, efektu horiek egun gutxitan desagertu ohi baitira.
- » Zure medikuarekin harremanetan jarri behar duzu sintoma hauetakoren bat larria bada edo desagertzen ez bada: asaldura, dardara, apetitu-galera, urdaileko mina, aho lehorra, gehiegizko listu-jariatzea, ezpainen hantura, idorreria, beherakoa, sukarra, gehiegizko egarria, aknearen okerragotzea, ilea galtzea.
- » Ez gidatu eta ez erabili makina arriskutsurik medikamentu honek nola eragiten dizun egiaztu arte.

Tratamenduak irauten duen bitartean, zure medikuak odoleko litio-mailak zehatztuko dizkizu, egokiak direla (tarte terapeutikoan daudela) egiazatzeko. Horretarako:

- Ez duzu litiozko dosia aldatu behar analitika egin aurreko 5 egunetan.
- Odola ateratzeko egunean ez duzu hartzu behar goizeko litiozko pilula. Odola atera bezain pronto hartzu ahalko duzu pilula hori.
- Ez da beharrezkoa baraurik joatea, kontrako esan ez badizute.

